

## Sortsbeskrivelse rabarber.

1. *A Cote Rouge*  
Få blomsterstængler, middellange og middeltukke stilke, svagt rødfarvet ved bladbasis og nærmest grøn ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, meget sen sort.(4.)
2. *Amerikansk Kæmpe*  
**Væksten er kraftig til middelkraftig med middelstore blade. Stilkene er af jævn størrelse, ret tykke og brede, oftest ret stærkt furede på bagsiden og med glat forside, ret tilbøjelig til at knække. Nederste del af stilken er oftest rødfarvet. Har ved Virum givet mange blomsterstængler, færre ved Spangsbjerg. Er for sildig til at få betydning til drivning og som tidlig frilandssort. (3.)**  
Mange blomsterstængler, lange og middeltukke stilke, svagt rødfarvet ved bladbasis og nærmest grøn ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middel tidlig sort.(4.)
3. *Appleton's Forcing*  
Middel antal blomsterstængler, lange og tykke stilke, mellem rød ved bladbasis og svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middel tidlig sort.(4.)
4. *Appleton's Red*  
Få blomsterstængler, lange til middellange stilke, tykke til middeltukke stilke, stærkt rødfarvet ved basis og mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, meget sen sort (4.)
5. *Appleton's Triumph*  
Mange blomsterstængler, middellange og tykke stilke, mellem rødfarvet ved basis og ingen eller svag rødfarvet ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)
6. *Behrens Rabarber*  
Få blomsterstængler, middellange og middeltukke stilke, mellem rødfarvet ved basis og knapt mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, lavt udbytte af stilke, meget sen sort (4.)
7. *Browns Red*  
Mange blomsterstængler, meget lange og tykke stilke, svag til mellemrød farve ved basis og kun svagt lysrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)
8. *Buck's Early Red*  
Særdeles mange blomsterstængler, middel lange og middel tykke stilke, svag til mellemrød farve ved basis og svagt rødfarvet ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middelsen til sen sort (4.)
9. *Canada Red*  
Egnet til frysning og kompot. Giver et stort antal stilke af middelstørrelse. Stilkene glatte, i hele længden røde. Indvendig stærkt røde i nedre halvdel, i den øvre del svagt røde. Stilkoversiden er i den nedre del plan, opefter med fremstående kant. Moderat antal blomsterstængler. Ret sildig sort. (2.)  
Få blomsterstængler; korte og tynde stilke, stærkt rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, meget sen sort (4.)
10. *Collis Seedling*  
Middel antal blomsterstængler, lange og meget tykke stilke, svag til mellemrød farve ved basis og svag rødfarvet ved bladplade, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, meget sen sort (4.)
11. *Crimson Queen (=Crimsons Perfection ?)*

Mange blomsterstængler, middel lange og middel tykke stilke, mellemrød farve ved basis og svagt til mellemrød farve ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middelsen til sen sort (4.)

12. *Dancer's Early Red*

Særdeles mange blomsterstængler, middellange til lange og middeltukke stilke, svagt rødfarvet til mellemrød ved basis og grøn til svagt rød ved bladpladen, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)

13. *Daw's Challenge*

Middel antal blomsterstængler, mange og lange stilke, stærkt rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middelsen til sen sort (4.)

14. *Daw's Champion*

Middel antal blomsterstængler, lange til meget lange og tykke til meget tykke stilke, mellemrød farve ved bladbasis og knapt mellemrød farve ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel sen sort (4.)

15. *Donkere Bloedrode*

Middel antal blomsterstængler, middel lange og middel tykke stilke, stærkt rødfarvet ved basis og knapt mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)

16. *Early Albert*

**Middelkraftig vækst med ret store, grønne til lysgrønne blade. Stilkene middellange, ret smalle og nærmest tynde med et lille stilkfæste. Meget stærkt furet på bagsiden og omtrent glat på forsiden. Stilkene er meget skøre og derfor tilbøjelige til at knække under trækningen. Farven grøn med lidt rødt på nederste halvdel. Indvendig er farven grøn til svagt blegrød. Sorten er meget tilbøjelig til at give blomsterstængler. Det er en ret yderig og meget tidlig sort, som dog nærmest kun har betydning som drivsort og til meget tidlig trækning på friland. Til sommerbrug er stilkene for tynde, grønne og uanselige. (3.)**

Middel antal blomsterstængler, middel lange og middel til tykke stilke, mellemrød farve ved basis og svagt rødfarvet ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, over middel tendens til knækkede stilke, tidlig til middeltidlig sort (4.)

17. *Early Red Seedling*

Middel antal blomsterstængler, korte til middellange og middeltukke stilke, mellemrød farve ved basis og svagt rødfarvet ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel tendens til knækkede stilke, tidlig til middeltidlig sort (4.)

18. *Early Red (Wisley)*

Få blomsterstængler, lange og tynde til middeltukke stilke, svagt til mellemrød farve ved basis og svagt rødfarvet ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, mideltidlig til sen sort (4.)

19. *Early Sunrise*

Giver et stort udbytte af lange og tykke stilke, der er middel stærkt rødfarvede.

Kan trækkes ret tidligt i foråret. Har tendens til at danne mange blomsterstængler. Vokser med opret vækst. Har middelstort indhold af oxalsyre og lidt under middel indhold af æblesyre. (1.)

Middel antal blomsterstængler, meget lange og middeltukke stilke, stærkt rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, stærkt rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)

20. *Edina*

Få blomsterstængler, mellem lange til lange og middeltukke til tykke stilke, mellem til stærk rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lyserød, stort udbytte af stilke, tidlig sort (4.)

21. *Elmsfeuer*

Giver et relativt lavt udbytte med middelstore stilke. Stilken er stærkt rød farvet. Har kun lille tendens til blomstring. Stilkene er meget lette at trække. Sorten er sen i høsttjenlighed. Har meget opret vækst. Mere end middelhøjt indhold af oxalsyre og middelhøjt indhold af æblesyre. Egner sig på grund af sin farve godt til marmelade i blanding med frugter. (1.) / *Egnet til frysning og kompot. I øvrigt hvor der fordres dyb rød farve. Sorten er sildig. Giver temmelig få, middellange, ret tunge stilke. Er mørkrød næsten til bladpladen. Indvendig rød i hele længden. Stilkoversiden er opefter med dyb fure, undersiden riflet. Danner kun få blomsterstængler. Stilkene er noget tilbøjelige til at knække, og hjerteskuddet kan rives med op ved trækningen. (2.)*

**Kraftig vækst med ret store mørkegrønne blade. Stilkene middellange, ret tykke med mørkerødt bladfæste. Meget stærkt furet bagside og en noget dyb og riflet sænkning på forsiden. Farven er stærkt skinnende mørkerød aftagende til svagt rødlig eller grøn op mod bladet, ofte lidt sribet. Indvendig mørkerød til rød og noget lysere opefter. Giver ikke mange blomsterskud. I brugsværdi må sorten nærmest sammenlignes med de rødstilkede sorter, *Vinrabarber*, og i forhold til disse giver den betydelig større, men langt færre stilke, og i vægtudbytte står den som nr. 3 af de rødstilkede sorter. Stilkene er noget tilbøjelige til at knække under trækningen. Det er en meget sildig sort. (3.)**

Ingen eller kun få blomsterstængler, middellange til lange og middeltukke stilke, stærkt rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)

22. *Fenton's Special*

Få blomsterstængler, kort til middellang og tynd til middeltukke stilke, mellemrød til stærk rødfarvet ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)

23. *Frigo (Sp. 45x)*

Velegnet til frysetørring. Har god rararberduft og smag. Giver et stort antal stilke af middelstørrelse. Stilke røde til brunlig røde, mod bladpladen grønne. Indvendig svagt rød farvet. Stilkoversiden er i den nedre del næsten plan, i den øvre med stærkt fremtrædende rande. Stilkens underside furet. Danner kun få blomsterstængler.(2.)

Få blomsterstængler, meget lange og middeltukke stilke, mellemrød til stærk rød ved bladbasis og svagt rød til mellemrød ved basis, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)

24. *Glaskin's Perpetual*

Middel antal blomsterstængler, meget korte og tynde stilke, stærk rød ved bladbasis og svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, stærk tendens til knækning af stilke ved trækning, sen sort (4.)

25. *Hawke's Champagne*

**Væksten er, af en tidlig sort at være, temmelig kraftig. Bladene middelstore, nærmest lysgrønne med stærkt krusede rande. Stilkene lange, næsten glatte med flad bredside og fyldige. Stilkfæstet er hvidt eller svagt rosafarvet. Den nederste del af stilken er rød, og ret ofte når den røde farve helt op til bladfæstet. Den indvendige farve varierer mellem lyserød og grøn. Blomstrer ikke særlig meget. Det er en meget tiltalende sort, som giver en smuk og god salgsvare. Den må anses for at være særlig egnet til drivning og til tidlig forsyning på friland. (3.)**

Få blomsterstængler, middel lange til lange og middel tykke til tykke stilke, mellem rød ved basis og svag til mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, middel udbytte af stilke, tidlig sort (4.)

26. *Hobday's Gigant(Giant)*

**Væksten er meget kraftig med store, brede og meget mørke, matgrønne blade, med tæt og kort, dunet behåring. Stilkene er lange, brede, noget uens i type med bredt kort, hvidt stilkfæste, svagt rillet bagside og en jævn dyb, men smal sænkning på forsiden. Farven er grøn med røde striber og til dels med en ret stærk farve på stilkens nederste del.**

**Indvendig er farven grøn med svagt røde punkter eller stiber. Er noget mindre tilbøjelig til at blomstre end Victoria. Står langt tilbage for Victoria, både med hensyn til antal stilke og vægtudbytte. (3.)**

Få blomsterstængler, meget lange og meget tykke stilke, svag rød ved basis og ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)

27. *Holsteiner Blut*

Udbytte og stilkantal middelstort. Stilkene middellange, noget krumme, mørk røde, især ved grunden. Indvendig røde i nedre del. Stilkoversiden er plan, men mod bladpladen med stærkt fremtrædende rande. Grønlig mellem randene. Moderat antal blomsterstængler. Har relativt højt oxalsyreindhold. (2.)

Få blomsterstængler, lange til meget lange og tykke stilke, mellem rød til stærk rød ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, middel udbytte af stilke, meget sen sort (4.)

28. *Laxton's nr. 1*

Middel antal blomsterstængler, korte til middel lange og tynde til middel tykke stilke, mellem rød til stærk rød ved basis og svag rød til mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)

29. *Linnaues*

Middeltidlig sort. Giver et middelstort antal kraftige, ret lange stilke. Farven grønlig, kun i den nedre del rød prikket. Indvendig grønlig. Stilkene glatte, oversiden plan, kun mod bladpladen noget konkav. Danner temmelig mange blomsterstængler. (2.)

Mange blomsterstængler, lange til meget lange og tykke til meget tykke stilke, svagt rød ved basis og ingen eller kun svag rød farve ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middel tidlig sort (4.)

30. *Marshall's Early Red*

Giver et relativt lavt udbytte med ret korte og tynde stilke. Stilkene er stærkt rød farvede. Danner kun få blomsterstængler. Stilkene kan være lidt vanskelige at trække. Har karakteristisk udbredt vækstform. Over middel højt indhold af oxalsyre og æblesyre. Egner sig på grund af sin farve godt til marmelade i blanding med frugter. (1.) /

*Egnet til frysning, kompot og specielt, hvor der fordres stærk rød farve. Giver et stort antal korte til middellange, ret tynde stilke, forneden mørkrøde, mod bladpladen rødpunkteret.*

*Indvendig rød i den nedre del, opefter næsten grøn. Stilkene glatte, plane, kun mod bladpladen med fremstående rande. Danner kun få blomsterstande. (2.) /*

**Middel af vækst med langstrakte grønne til mørkegrønne blade med stærkt bølgede rande. Stilkene næsten uden furer og lidt større end hos Vinrabarber. Farven er mørkerød til rød på den nederste del og rødpunkteret oppe ved bladfæstet. Indvendig er farven rød, særlig i den nederste halvdel, og lysere opefter, undertiden lidt grønlig. Giver som sorter af denne type ret få blomsterstængler. Det er en meget yderig sort, som har givet et meget stort antal stilke, og den ligger tillige over de øvrige sorter af samme type i vægtudbytte. Det er en meget værdifuld sort til friland. (3.)**

Ingen eller kun få blomsterstængler, middel lange til lange og tynde stilke, stærk rød ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)

31. *McDonald*

Middel antal blomsterstængler, korte til middellange og tynde stilke, stærk rød ved basis og mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, middel udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)

32. *Mitchell's Early Albert*

Middel antal blomsterstængler, middellange og middeltykkede til tykke stilke, mellem rød ved basis og svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, stærk tendens til knækning af stilke ved trækning, tidlig til middeltidlig sort (4.)

33. *Paragon*

Ingen eller kun få blomsterstængler, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)

34. *Prince Albert*

Mange blomsterstængler, lange og tykke stilke, stærkt røde ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middel tidlig/sen sort (4.)

35. *Red Delikatesse*

Få blomsterstængler, lange til meget lange og tynde til middeltykkede stilke, mellemrød til stærkt rød ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, lidt tendens til knækning af stilke ved trækning, middelsen sort (4.)

36. *Reed's Early Superb (Reeds ? EU's sortliste)*

Få blomsterstængler, lange og middeltykkede til tykke stilke, stærk rød ved basis og svag rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middelsen til sen sort (4.)

37. *Riverside Gigant*

Mange blomsterstængler, lange til meget lange stilke og middel tykke til tykke stilke, mellemrøde ved basis og svag til mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, tidlig til middeltidlig sort (4.)

38. *Rosara (Sp. nr. 123)*

Ret tidlig sort. Giver et middelstort antal stilke, der er glatte, middellange og middelkraftige. Farven klar rød, grønlig mod bladpladen. Indvendig grøn, mod basis svagt rød. Stilkoversiden plan, opefter svagt konkav. Moderat antal blomsterstængler. Har ret lavt oxalsyreindhold. (2.) Middel antal blomsterstængler, lange og middeltykkede til tykke stilke, mellem røde ved basis og svag rød til mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, tidlig til middeltidlig sort (4.)

39. *Rosenhagen*

Giver et middelhøjt udbytte af middellange og mellemtykke stilke, der hovedsageligt er delvist rødfarvede. Stor tilbøjelighed til at danne blomsterstængler. Stilkene er middellette at trække. Har udbredt tendens til opret vækst, lavt indhold af oxalsyre og middelhøjt indhold af æblesyre. ( 1. )

Mange blomsterstængler, korte til middel lange og middel tykke til tykke stilke, svag rød til mellemrød ved basis og svag rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)

40. *Ruby*

Middel antal blomsterstængler, lange og tynde til middeltykkede stilke, mellem rød til stærk rød ved basis og mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)

41. *R. var. ex. Sherburn Park, Glos*

Særdeles mange blomsterstængler, korte og tynde til middeltykkede stilke, svag rød til mellemrød ved basis og svag rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)

42. *Seedling nr. 1 (Merton Foremost)*  
Ingen blomsterstængler, lange til meget lange og tykke stilke, svag rød ved basis og grøn ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel sen sort (4.)
43. *Seedling nr. 3*  
Middel antal blomsterstængler, lange og meget tykke stilke, svag rød til mellemrød ved basis og svag rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
44. *Seedling nr. 6*  
Ingen blomsterstængler, meget lange og middel tykke til tykke stilke, mellemrød til stærk rød ved basis og mellemrød ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)
45. *Seedling nr. 7*  
Særdeles mange blomsterstængler, lange og tykke til meget tykke stilke, svag til mellemrød ved basis og kun svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
46. *Seedling nr. 8*  
Få blomsterstængler, middel lange til lange og middel tykke til tykke stilke, mellem røde til stærkt røde ved basis og mellem røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
47. *Seedling nr. 9*  
Ingen blomsterstængler, lange til meget lange og tykke til meget tykke stilke, mellem rød ved basis og svag til mellem rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, middel udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)
48. *Seedling nr. 11*  
Middel antal blomsterstængler, lange til meget lange og middel tykke stilke, svagt røde til mellem røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, svag tendens til knækning af stilk ved trækning, middel sen til sen sort (4.)
49. *Seedling nr. 12 (Udgået)*
50. *Seedling Piggott (Udgået)*
51. *Spangsbjerg nr. 2x*  
Særdeles mange blomsterstængler, lange til meget lange og middel tykke til tykke stilke, mellem røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middel sen sort (4.)
52. *Spangsbjerg nr. 35x*  
Middel antal blomsterstængler, lange og middel tykke til tykke stilke, mellemrøde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, middel udbytte af stilke, sen sort (4.)
53. *Spangsbjerg nr. 53x*  
Middel antal blomsterstængler, kort til middel lang og tynd til middel tyk stilk, mellemrød ved basis og svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, lavt udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
54. *Spangsbjerg nr. 140*  
Ingen eller kun få blomsterstængler, middel lange til lange og middel tykke til tykke stilke, svagt røde til mellemrøde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, svag tendens til knækning af stilke ved trækning, middel sen til sen sort (4.)

55. *Spangsbjerg nr. 242*  
Middel antal blomsterstængler, lange og tykke stilke, svagt røde til mellemrøde ved basis og ingen eller kun svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)
56. *Spangsbjerg nr. I9*  
Få blomsterstængler, middel lange og tynde til middel tykke stilke, mellem røde til stærkt røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)
57. *Spangsbjerg nr. I16*  
Mange blomsterstængler, middel lange og tynde stilke, stærkt røde ved basis og mellem til stærkt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, middel tendens til knækning af stilke ved trækning, tidlig til middel tidlig sort (4.)
58. *Spangsbjerg nr. I19*  
Få blomsterstængler, lange til meget lange og middel tykke stilke, mellem røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, middel udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
59. *Spangsbjerg nr. I22*  
Ingen eller kun få blomsterstængler, lange og tynde til middel tykke stilke, mellem røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, lavt udbytte af stilke, middel sen sort (4.)
60. *Spangsbjerg nr. III5 (Spangsbjerg)*  
Giver stort udbytte af middellange og middel tykke stilke, der mellem røde af farve. Danner ret få blomsterstilke. Kan være lidt vanskelig at trække. Har udbredt til opret vækst. Har middelstort indhold af både oxal- og æblesyre. Omtales i Sverige som en sort med god "rabarbersmag". ( 1. )  
Middel antal blomsterstængler, korte til middel lange og tynde til middel tykke stilke, mellem røde til stærkt røde ved basis og svagt røde til mellem røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)
61. *Stott's Monarch*  
Meget stort antal blomsterstængler, meget lange og tykke til meget tykke stilke, svagt røde ved basis og grønne til svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, meget sen sort (4.)
62. *Strawberry*  
Mange blomsterstængler, middel lange til lange og middel tykke til tykke stilke, svagt røde ved basis og grønne til svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, middel udbytte af stilke, middel tidlig/sen sort (4.)
63. *Sunrise*  
Ingen eller kun få blomsterstængler, middel lange til lange og middel tykke til tykke stilke, stærkt røde ved basis og mellem røde ved bladpladen, stort udbytte af stilke, middel sen til sen sort (4.)
64. *The Sutton*  
**Middelkraftig vækst. Bladene nærmest små, grønne til lysgrønne. Stilkene er lange, slanke og ensartede, næsten glatte. Aftager ikke meget i tykkelse fra foden til bladfæstet. Farven er grøn med lidt røde pletter og striber på den nederste halvdel. Ligesom tilfældet er med de fleste tidlige og middeltidlige sorter er den tilbøjelig til at blomstre meget. Det er en forholdsvis tidlig og yderig sort. (3.)**

Få blomsterstængler, lange og tynde til middel tykke stilke, mellemrøde til stærkt røde ved basis og svagt røde til mellemrøde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, middel tidlig/sen sort (4.)

65. *Timperley Early*

Kan trækkes meget tidlig om foråret. Giver et middelstort antal af ret kraftige stilke, forneden rødlig, opefter rød punkteret til rent grøn. Indvendig grøn, ved basis svagt rødlig. Stilkoversiden glat og plan, kun svagt konkav mod bladpladen. Danner temmelig mange blomsterstængler. Har ret lavt oxalsyreindhold. (2.)

Få blomsterstængler, lange til meget lange og tykke stilke, svagt røde til mellem røde ved basis og svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, tidlig sort (4.)

66. *Tingley Cherry*

Mange blomsterstængler, lange til meget lange og tykke stilke, mellemrød ved basis og svagt rød ved bladpladen, indvendig stilkfarve svagt rød, stort udbytte af stilke, sen sort (4.)

67. *Tobolsk*

Få blomsterstængler, meget lange og meget tykke stilke, svagt røde til mellemrøde ved basis og grønne til svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve grøn, stort udbytte af stilke, tidlig sort (4.)

68. *Valentine*

Velegnet til frysning og til fremstilling af kompot. Udbytte og stilkantal er middelstort. Stilke ret kraftige og røde i næsten hele længden. Indvendig røde i nedre halvdel, opefter svagt røde. Stilke middellange, glatte, oversiden plan med lidt fremstående rande mod bladpladen. Nem at trække. Danner ret få blomsterstængler. (2.)

Ingen blomsterstængler, lange til meget lange og middel tykke stilke, stærkt røde ved basis og mellem røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)

69. *Victoria*

Giver stort udbytte af lange og middel tykke stilke, der er mest grønne af farve. Har meget stor tilbøjelighed til at danne blomsterstængler. Er middel let at trække. Har typisk udbredt vækst. Stilkene har lavt indhold af oxalsyre og middelstort indhold af æblesyre. Egner sig bedst til saftproduktion. Sorten er optaget på EU's officielle liste over grønsagssorter. ( 1. ) / *Egnet til drivning. Har et middelstort antal kraftige, middellange, tykke stilke. Farven er forneden rødlig eller rød punkteret, opefter grøn. Indvendig farve grøn. Stilkene noget ru, undersiden ret dybt furet, oversiden ved grunden lidt konkav, mod bladpladen med bred, fremstående rand. Danner et middelstort antal blomsterstængler.(2.)/*

**Det er en både gammel og meget udbredt sort, som stammer fra England. Væksten er meget kraftig og til dels opret. Bladene er store, brede, mørkegrønne med lidt bølget rand og tæt og kort behåring på overfladen. Stilkene er meget lange, brede og tykke med jævnt stort stilkfæste og svagt furet på bagsiden og har en ret bred, men ikke dyb indsænkning eller fure på forsiden. Farven er grøn, på nederste halvdel rød eller rødtribet, indvendig grøn; giver forholdsvis mange blomsterstængler. Sorten er sildig til middelsildig og ligger betydelig over de øvrige prøvede sorter i kg. pr. a. Under gode forhold, fugtig jord og rigelig gødsning kan stilkene opnå en meget betydelig størrelse og vægt. Sorten er overordentlig stærkt udbredt, både til torvebrug og til dyrkning i private haver. (3.)**

Middel antal blomsterstængler, meget lange og middel tykke stilke, svagt røde til mellemrøde ved basis og grønne/svagt røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, tidlig til middeltidlig sort (4.)

70. *Vinrabarber (Svendborg)*



Egnet til frysning, kompot og hvor der specielt fordres stærk rød farve. Har et ret stort antal korte til middellange, stærkt rødfarvede stilke. Indvendig rød næsten til bladpladen. Saftfarven mørkrød. Stilkene glatte, oversiden næsten plan, opefter konkav. Ret nem at trække. Danner kun få blomsterstængler. (2.)/

**Adskiller sig fra *Marshall's Early Red* ved at stilkene er stærkere rødfarvet, både indvendig og udvendig, og tillige er stilkene lidt mindre. Den har givet et stort udbytte af stilke, men ligger dog en del lavere end *Marshall's Early Red*, særlig i vægtudbytte. Giver et meget fint produkt og må anses at være en meget værdifuld sort til torvebrug. (3.)**

Ingen eller kun få blomsterstængler, meget lange og tynde til middel tykke stilke, stærkt røde ved basis og mellem røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve rød, stort udbytte af stilke, sen til meget sen sort (4.)

#### 71. *Vroege Engelse*

Ingen eller kun få blomsterstængler, meget lange og tykke stilke, mellem røde til stærkt røde ved basis og svagt røde til mellem røde ved bladpladen, indvendig stilkfarve lysrød, stort udbytte af stilke, svag tendens til knækning af stilke ved trækning, sen til meget sen sort (4.)

#### 72. *Elmsblitz*

Giver et stort udbytte af middellange stilke, der både er røde og grønne i farve.

Udviser nogen tendens til at danne blomsterstængler. Har middelsvær trækkelethed. Væksten er udbredt til opret. Har lavt indhold af oxalsyre og lidt over middel indhold af æblesyre. ( 1. )

#### Referencer:

1. Henriksen, K. og Bjørn, G. 2004. Sorter og kloner af rabarber. Sortsforsøg med rabarber ved Årslev 1997-1998. DJF rapport Havebrug nr. 31, 10pp. Danmarks JordbrugsForskning.

2. Thuesen, A. 1982. Sortsvurdering af rabarber 1977-79. Tidsskrift f. Planteavl 86: 177-184. Beretning nr. 1592 fra Statens Planteavlsvforsøg.

3. Christiansen, E. og Henriksen, A. 1945. Dyrkningsforsøg med rabarbersorter. 1933-1943. Tidsskrift f. Planteavl 49: 234-251. Beretning nr. 381 fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.

4. Rumpunen, K. & Henriksen, K. 1999. Phytochemical and morphological characterization of seventy-one cultivars and selections of culinary rhubarb (*Rheum spp.*). Journal of Horticultural Science & Biotechnology 74 (1): 13-18.